


| Obszar zastosowania: | |
|--|-------------------|
| otwieracz | Piktogram nr 6 |
|  | |
| Procedura: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Usuń powierzchniwe zanieczyszczenia 2. Zastosuj roztwór myjący 3. Pozostaw na kilka minut 4. Dokładnie wyszoruj 5. Wypłucz zużyty roztwór 6. Zastosuj środek dezynfekujący 7. Pozostaw na 15 minut 8. Wypłucz w wodzie 9. Pozostaw do wyschnięcia | |
| Czyszczenie: | Clinex 4-Dirt |
| Temperatura: | ciepła |
| Dozowanie: | 0,5-5% [5-50ml/L] |
| Dezynfekcja: | Clinex Barren |
| Temperatura: | 20 stC |
| Dozowanie: | 0,5-1% [5-10ml/L] |
| Narzędzia: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • szczotka i wiadro do czyszczenia • szczotka i wiadro do dezynfekcji • zlewozmywak mieszczący cały otwieracz • rękawice • fartuch • ścierka | |
| Dodatkowe uwagi: | |
| <p>Dezynfekuj otwieracz do konserw każdorazowo po otwarciu nowego rodzaju puszkowanego produktu, np. po otwarciu konserw mięsnych zdezynfekuj otwieracz zanim zaczniesz otwierać puszki z owocami.</p> | |
| <p>W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX</p> | |